

## Verbal Rating Scale

Bron: Herr, K. A. & Mobily, P. R. (1993). Comparison of selected pain assessment tools for use with the elderly. *Appl.Nurs.Res.*, 6, 39-46.

Instructions: Have the patient circle the words to indicate the intensity of current pain. Document the corresponding number that the patient marks on this tool. A response of "No Pain" is given a value of zero, whereas a response of "Pain As Bad As It Could Be" is given a value of six. Evaluating the numerical value of the pain score or the descriptor selected by the patient over time helps determine whether pain intensity is less following pharmacological and/or nonpharmacological treatments.

**Pain as bad as it could be**

**Extreme pain**

**Severe pain**

**Moderate pain**

**Mild pain**

**Slight pain**

**No pain**

Reprinted with permission from the Dr. K. Herr.

## Verbal Rating Scale

Instructions : Demandez au patient d'entourer les mots qui correspondent au mieux à l'intensité actuelle de sa douleur. Considérez le nombre correspondant aux mots que le patient a choisi. Pour la réponse "pas de douleur" donnez la valeur 0, alors que pour "la pire douleur qui puisse exister" donnez la valeur 6. Evaluer régulièrement les mots que le patient choisi à intervalles réguliers permet de déterminer si l'intensité de la douleur augmente ou diminue en regard des traitements médicamenteux ou non médicamenteux que vous mettez en œuvre.

- La pire douleur qui puisse exister
- Douleur extrême
- Douleur sévère
- Douleur modérée
- Douleur légère
- Douleur insignifiante
- Pas de douleur