

Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) Avec l'approbation de l'auteur : Kruizenga, H.M.

Source : Neelemaat, F., Kruizenga, H. M., de Vet, H. C., Seidell, J. C., Butterman, M., & van Bokhorst-de van der Schueren MA (2008). Screening malnutrition in hospital outpatients. Can the SNAQ malnutrition screening tool also be applied to this population? Clin.Nutr., 27, 439-446.

Site Web : www.stuurgroepvoeding.nl

SNAQ Short Nutritional Assessment Questionnaire	
• Did you lose weight unintentionally? More than 6 kg in the last 6 months More than 3 kg in the last month	● ● ● ● ●
• Did you experience a decreased appetite over the last month?	●
• Did you use supplemental drinks or tube feeding over the last month?	●
 ● no intervention ● ● moderately malnourished; nutritional intervention ● ● ● severely malnourished; nutritional intervention and treatment dietician	

Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ)

source : Zazzo JF., Stratégie de dépistage et de prise en charge de la dénutrition : réanimation - <http://www.springerlink.com/content/x0ln714256137682/> - page consultée le 21 septembre 2009

QUESTIONS	SCORE	OR (IC 95 %)
Avez-vous perdu plus de 6 kg au cours des 6 derniers mois ?	3	267,0 (30,0 - 2 376,2)
Avez-vous perdu plus de 3 kg au cours du mois dernier ?	2	37,7 (12,5 - 113,6)
Avez-vous remarqué une diminution de l'appétit au cours du dernier mois ?	1	4,2 (1,5 - 11,4)
Avez vous consommé un supplément énergétique ou reçu une nutrition entérale au cours du dernier mois ?	1	4,3 (1,4 - 13,9)

Score ≥ 2 : dénutrition modérée

Score ≥ 3 : dénutrition sévère

Fig. 6 - Détection de la dénutrition selon le *Short Nutritional Assessment Questionnaire* (SNAQ) (11).