

Bron: Detsky, A.S., McLaughlin, J.R., Baker, J.P., Johnston, N., Whittaker, S., Mendelson, R.A., et al. (1987).

What is subjective global assessment of nutritional status? J. Parenter. Enteral. Nutr. 11(1), 8-13

**A/ History** (Select appropriate category with a checkmark, or enter numerical value where indicated by "#")

**1. Weight Change**

Overall loss in past 6 months: amount = # \_\_\_\_\_ kg; % loss = # \_\_\_\_\_

Change in past 2 weeks: \_\_\_\_\_ increase  
 \_\_\_\_\_ no change  
 \_\_\_\_\_ decrease

**2. Dietary intake change (relative to normal)**

\_\_\_\_\_ No change  
 \_\_\_\_\_ Change \_\_\_\_\_ duration = # \_\_\_\_\_ weeks  
 \_\_\_\_\_ type: \_\_\_\_\_ suboptimal solid diet, \_\_\_\_\_ full liquid diet  
 \_\_\_\_\_ hypocaloric liquids, \_\_\_\_\_ starvation

**3. Gastrointestinal symptoms (that persisted > 2 weeks)**

\_\_\_\_\_ none, \_\_\_\_\_ nausea, \_\_\_\_\_ vomiting, \_\_\_\_\_ diarrhea, \_\_\_\_\_ anorexia

**4. Functional Capacity**

\_\_\_\_\_ No dysfunction (e.g., full capacity),  
 \_\_\_\_\_ dysfunction \_\_\_\_\_ duration = # \_\_\_\_\_ weeks  
 \_\_\_\_\_ type: \_\_\_\_\_ working suboptimally  
 \_\_\_\_\_ ambulatory  
 \_\_\_\_\_ bedridden

**5. Disease and its relation to nutritional requirements**

Primary diagnosis (specify) \_\_\_\_\_

Metabolic demands (stress): \_\_\_\_\_ no stress, \_\_\_\_\_ low stress  
 \_\_\_\_\_ moderate stress, \_\_\_\_\_ high stress

**B/ Physical** (for each trait specify: 0=normal, 1+ = mild, 2+ = moderate, 3+ = severe)

# \_\_\_\_\_ loss of subcutaneous fat (triceps, chest)

# \_\_\_\_\_ muscle wasting (quadriceps, deltoids)

# \_\_\_\_\_ ankle edema

# \_\_\_\_\_ sacral edema

# \_\_\_\_\_ ascites

**C/ SGA rating** (select one)

\_\_\_\_\_ A= Well nourished

\_\_\_\_\_ B= Moderately (or suspected of being) malnourished

\_\_\_\_\_ C= Severely malnourished

Subjective Global Assessment (SGA) Nederlandse versie

Bron : FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (2008). *Advies van de Wetenschappelijke Expertengroep Ondervoeding van het Nationaal Voedings -en Gezondheidsplan voor België: Screening op ondervoeding en evaluatie van de voedingstoestand (Nutritional Assessment)*. Extrait le 16 février '09 :

[https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET\\_PG/HOMEPAGE\\_MENU/MIJNGEZONDHEID1\\_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1\\_MENU/ALIMENTATION1\\_MENU/BELGIQUE1\\_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPTAUXMAISONSDE\\_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPTAUXMAISONSDE\\_DOCS/NVGP-B%20SCREEN%20808.PDF](https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPTAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPTAUXMAISONSDE_DOCS/NVGP-B%20SCREEN%20808.PDF)

ITEM	BEOORDELING	SCORE
GEWICHTSVERLIES (3-6 maand)	= vraag die bij initiële screening wordt gesteld	<input type="checkbox"/> Score 0= A <input type="checkbox"/> Score 1 = B <input type="checkbox"/> Score 2 of 3 = C
GEWICHTSEVOLUTIE (3-6maand)	<input type="checkbox"/> 5-10% aanhoudend verlies <input type="checkbox"/> 5-10% verlies maar duidelijke verbetering <input type="checkbox"/> >10% aanhoudend verlies <input type="checkbox"/> >10% verlies maar aanhoudende verbetering	<input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> B
SPIERATROFIE	<input type="checkbox"/> Weinig of geen depletie in meeste of alle gebieden <input type="checkbox"/> Lichte tot matige depletie in meeste of alle gebieden <input type="checkbox"/> Matige tot ernstige depletie in enkele gebieden <input type="checkbox"/> Ernstige depletie in de meeste of alle gebieden	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
OEDEMEN	<input type="checkbox"/> Weinig of geen <input type="checkbox"/> Licht tot matig <input type="checkbox"/> Matig tot ernstig	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
SUBCUTAAN VET	<input type="checkbox"/> Weinig of geen depletie in meeste of alle gebieden <input type="checkbox"/> Lichte tot matige depletie in meeste of alle gebieden <input type="checkbox"/> Matige tot ernstige depletie in enkele gebieden <input type="checkbox"/> Ernstige depletie in de meeste of alle gebieden	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
WIJZIGING VOEDSELINNAME	<input type="checkbox"/> Geen verandering of verandering van korte duur <input type="checkbox"/> Matige inname maar verbetering <input type="checkbox"/> Matige inname maar verslechtering	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
DUUR WIJZIGING VOEDSELINNAME	<input type="checkbox"/> < 2 weken <input type="checkbox"/> > 2 weken, licht tot matig niet optimaal voedsel <input type="checkbox"/> Geen mogelijkheid tot eten	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
GASTRO- INTESTINALE PROBLEMEN	<input type="checkbox"/> Geen of weinig symptomen <input type="checkbox"/> Matige symptomen > 2 weken <input type="checkbox"/> Ernstige symptomen maar verbetering <input type="checkbox"/> Ernstige symptoom(omen) > 2 weken	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
FUNCTIONALITEIT	<input type="checkbox"/> Geen verandering <input type="checkbox"/> Ernstig verlies maar verbetering <input type="checkbox"/> Bedlegerig	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C
Aantal keer A :		A : goede voedingstoestand
Aantal keer B :		B : licht tot matig ondervoed
Aantal keer C :		C : ernstig ondervoed

## Overige referenties

FOD Volksgezondheid Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (2008). Advies van de Wetenschappelijke Expertengroep Ondervoeding van het Nationaal Voedings -en Gezondheidsplan voor België: Screening op ondervoeding en evaluatie van de voedingstoestand (Nutritional Assessment).

[www.mijnvoedingsplan.be](http://www.mijnvoedingsplan.be) Opgehaald op 16 februari 2009 van:

[https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET\\_PG/HOMEPAGE\\_MENU/MIJNGEZONDHEID1\\_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1\\_MENU/ALIMENTATION1\\_MENU/BELGIQUE1\\_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE\\_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE\\_DOCS/NVG\\_P-B%20SCREEN%20808.PDF](https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/MIJNGEZONDHEID1_MENU/PRODUITSDECONSOMMATION1_MENU/ALIMENTATION1_MENU/BELGIQUE1_MENU/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_HIDE/DENUTRITIONDANSLESHOPITAUXMAISONSDE_DOCS/NVG_P-B%20SCREEN%20808.PDF)

Gerasimidis, K., Drongitis, P., Murray, L., Young, D., & McKee, R. F. (2007). A local nutritional screening tool compared to malnutrition universal screening tool. *Eur.J.Clin.Nutr.*, *61*, 916-921.